



CANAURAL®


Otitis externa

TIME TO CHANGE

Stafylokokker er de mest almindelige bakterier ved otitis externa, og topikal behandling er det vigtigste redskab*.

Canaural® er et godt førstevalg i de tilfælde, hvor antibiotikabehandling er nødvendig.

Aktive stoffer	
Fusidinsyre	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt overfor <i>Staphylococcus spp</i> specielt <i>S. pseudintermedius</i> • Også aktiv overfor <i>Streptococcus spp</i> • Penetrerer huden • Forbliver stabilt og aktivt i pus
Framycetinsulfat	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt overfor gram- bakterier, specielt <i>Pseudomonas spp</i>
Nystatin	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt overfor <i>Malassezia pachydermatis</i>
Prednisolone	<ul style="list-style-type: none"> • Giver lindring af smerte og inflammation
Sesam olie	<ul style="list-style-type: none"> • Lav viscositet • Blødgør og løsner ørevoks




Vidste du at...

Restitensbestemmelser på Fusidinsyre typisk er baseret på den systemiske koncentration og ikke den topikale.

Ved topikal behandling er koncentrationen ved infektionen meget højere, og resultatet af resistensbestemmelsen kan derfor være misvisende.

Spørg dit laboratorie til råds om deres anvendte MIC værdi.




*Bajwa J. Canine otitis externa - Treatment and complications. Can Vet J. 2019; 60(1) :97-99.

INDE I HUNDENS ØRE

LODRET
DEL AF
ØREGANG

INDRE ØRE

TIME TO CHANGE



MELLEMØRE

TROMMEHINDE

VANDRET DEL
AF ØREGANG

Canaural®


Dechra
Veterinary Products

Canaural. Øredråber, suspension. **Aktive stoffer:** Diethanolaminfusidat 5,0 mg, framycetinsulfat 5,0 mg, nystatin 100.000 IE, prednisolon 2,5 mg. **Rx. ATC vet-kode:** QS 02 CA 01. **Dyrearter:** Hund. **Terapeutiske indikationer:** Otitis externa hos hund. **Kontraindikationer:** Må ikke anvendes til hunde med perforeret trommehinde. Må ikke anvendes til hunde med kendt overfølsomhed for indholdsstofferne. **Særlige advarsler for hver dyreart:** Betændelse i øregangen forårsaget af bakterier og svampe er ofte af sekundær natur. Den til grund liggende årsag bør derfor diagnosticeres og behandles. Efter behandlingen skal ørene checkes med jævnlige intervaller for symptomer på reinfektion. **Særlige forsigtighedsregler for dyret:** Kun til udvortes brug. Brug af lægemidlet bør baseres på identifikation af de inficerede organismer og resistensbestemmelse samt tage højde for officielle lokale antibiotika politikker. Brug af dette lægemiddel, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet kan føre til øget forekomst af bakterier, der er resistente overfor fusidinsyre eller framycetin sulfat. Langvarig og intensiv brug af topikale kortikosteroider er kendt for at udløse lokale og systemiske effekter, inklusive nedsat binyrefunktion, atrofi af epidermis og forlænget helingstid. Inden lægemidlet appliceres skal den ydre øregang omhyggeligt inspiceres for at sikre, at trommehinden ikke er perforeret og dermed undgå risikoen for at overføre infektionen til mellemøret og forebygge skade på det cochleære- og vestibulære apparat. Hvor der er tale om en øremide infektion skal det overvejes at behandle begge ører, selvom infektionen kun er tilstede i det ene øre. **Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:** Vask omhyggeligt hænderne efter håndtering af lægemidlet. Undgå hudkontakt. I tilfælde af utilsigtet eksponering skylles det berørte område med rigelige mængder vand. Personer med kendt overfølsomhed for indholdsstofferne skal undgå kontakt med lægemidlet. **Bivirkninger:** Hypersensitivitetsreaktioner kan forekomme. Brugen af præparatet i det ydre øre kan forårsage nedsat hørelse, primært i ældre hunde. Hvis dette iagttages, skal behandlingen afbrydes. **Drægtighed eller diegiving:** Lægemidlets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. **Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:** Ingen kendte. **Dosering og indgivelsesmåde:** Flasken skal OMRYSTES før brug. Det anbefales at rense og tørre den ydre øregang før behandling og overskydende hårvækst omkring behandlingsområdet bør fjernes. 5-10 dråber i øregangen 2 gange daglig i 10-14 dage. Øret bør masseres forsigtigt efter inddrypningen for at opnå en god fordeling af dråberne i øregangen. **Tilbageholdelsestid:** Ikke relevant. **Emballage:** Plastflaske med dråbespids. Pakningsstørrelser 1x15 ml og 1x25ml. **Indehaver af markedsføringstilladelsen:** Dechra Veterinary Products A/S. **Repræsentant:** Dechra Veterinary Products A/S. **Dato for ændring af teksten:** 8. september 2016. **Udleveringsbestemmelse:** B. **Ovenstående tekst er et forkortet resumé af sammendraget af produktgenskaber.** For yderligere information se venligst på www.medicintil dyr.dk eller kontakt www.dechra.dk. Dagsaktuel pris kan ses på www.medicinpriser.dk.